

Intervalle de fluctuation

1 Définition et premier exemple

Un médecin de santé publique veut savoir si, dans sa région, le pourcentage d'habitants atteints d'hypertension artérielle est égale à la valeur de 16% récemment publiée pour des populations semblables.

On note p la proportion d'hypertendus dans la population de sa région, ici on suppose donc que $p = 0,16$.

La question qu'on peut alors se poser est comment valider ou non cette hypothèse?

Le médecin va donc constituer un échantillon de $n = 100$ personnes choisies au hasard (la population est suffisamment importante pour considérer qu'il s'agit de tirages avec remise).

1. Soit X la variable aléatoire correspondant au nombre d'hypertendus observé dans un échantillon de taille $n = 100$. Déterminer la loi de X .

On cherche à déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, relatif à cet échantillon de taille $n = 100$, c'est à dire l'intervalle centré autour de p qui contient la fréquence observée f avec une probabilité égale à 0,95.

2. Déterminer le nombre d'hypertendus correspondant à la proportion d'hypertendus pour un échantillon de taille $n = 100$.
3. Déterminer le plus petit entier a tel que $P(X \leq a) > 0,025$.
4. Déterminer le plus petit entier b tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.
5. En déduire une majoration de $P(a \leq X \leq b)$.

Ainsi, la fréquence f observé par le médecin a une probabilité de 0,95 de vérifier $a \leq nf \leq b$ soit $\frac{a}{n} \leq f \leq \frac{b}{n}$. On en déduit que l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la proportion d'hypertendus $p = 0,16$ est l'intervalle

$$\left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$$

6. Le médecin recense 22 hypertendus sur son échantillon de taille $n = 100$. Quelle décision peut-il prendre?
7. Le médecin réalise un nouvel échantillon de taille $n = 1000$ et recense 179 hypertendus. Ce résultat confirme t'il le précédent?

2 Cours

Au sein d'une population, on suppose que la proportion d'un certain caractère est p . On souhaite juger cette hypothèse. Pour cela on prélève dans la population au hasard et avec remise, un échantillon de taille n sur lequel on observe une fréquence f de ce caractère.

Définition:

L'intervalle de fluctuation à 95% d'une fréquence, sur un échantillon aléatoire de taille n , selon la loi binomiale de paramètres n et p est :

$$\left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$$

avec a le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > 0,025$ et b le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 0,975$.

Règle:

- Si $f \in \left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$, l'hypothèse est acceptée au seuil de 95% ;
- Si $f \notin \left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$, l'hypothèse est rejetée au seuil de 5%.

3 Applications

Exercice 1:

Monsieur M , chef du gouvernement d'un pays lointain, affirme que 52% des électeurs lui font confiance. On interroge 100 électeurs au hasard (la population est suffisamment importante pour considérer qu'il s'agit de tirages avec remise) et on souhaite savoir à partir de quelles fréquences, au seuil de 95%, on peut mettre en doute le pourcentage annoncé par Monsieur M , dans un sens, ou dans l'autre.

1. On fait confiance à l'hypothèse de Monsieur M et soit X la variable aléatoire correspondant au nombre d'électeurs qui lui font confiance dans un échantillon de taille $n = 100$. Déterminer la loi de X .
2. Déterminer l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% obtenu grâce à la loi binomiale.
3. Comparer avec l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% donnée en seconde.
4. Sur les 100 électeurs interrogés au hasard, 43 déclarent avoir confiance en Monsieur M . Peut-on considérer, au seuil de 95%, l'affirmation de Monsieur M comme exacte ?

Exercice 2:

En novembre 1976 dans un comté du sud du Texas, Rodrigo Partida est condamné à huit ans de prison. Il attaque ce jugement au motif que la désignation des jurés de ce comté est, selon lui, discriminante à l'égard des Américains d'origine mexicaine. Alors que 80% de la population du comté est d'origine mexicaine, sur les 870 personnes convoquées pour être jurés lors des années précédentes, il n'y a eu que 339 personnes d'origine mexicaine.

Devant la Cour Suprême, un expert statisticien produit des arguments pour convaincre du bien fondé de la requête de l'accusé. En vous situant dans le rôle de cet expert, pouvez-vous décider si les Américains d'origine mexicaine sont sous-représentés dans les jurys de ce comté ?

Exercice 3:

Un groupe de citoyens demande à la municipalité d'une ville la modification d'un carrefour en affirmant que 40% des automobilistes tournent en utilisant une mauvaise file. Un officier de police constate que sur 500 voitures prises au hasard, 190 prennent une mauvaise file.

1. Déterminer, en utilisant la loi binomiale sous l'hypothèse $p = 0,4$, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%.
2. D'après l'échantillon, peut-on considérer, au seuil de 95%, comme exacte l'affirmation du groupe de citoyens ?

Exercice 4:

Dans le monde, la proportion de gauchers est 12%. Soit n le nombre d'élèves dans votre classe.

1. Déterminer, à l'aide de la loi binomiale, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% de la fréquence des gauchers sur un échantillon aléatoire de taille n .
2. Votre classe est-elle « représentative » de la proportion de gauchers dans le monde ?