Chapitre 7: Produit scalaire

1 Définition du produit scalaire

1.1 Produit scalaire de deux vecteurs colinéaires

Définition:

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non-nuls colinéaires tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

Le produit scalaire de $\vec{u}$ par $\vec{v}$, notée $\vec{u} \cdot \vec{v}$, est le nombre réel défini de la façon suivante :

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de même sens, $\vec{u} \cdot \vec{v} = OA \times OB$:

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont de sens opposés, $\vec{u} \cdot \vec{v} = -OA \times OB$:

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ on pose $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Remarque:

Le produit scalaire d'un vecteur $\vec{u}$ par lui-même, noté $\vec{u}^2$, est appelé le carré scalaire de $\vec{u}$.

$$\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u}$$

1.2 Produit scalaire de deux vecteurs quelconques

Définition:

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non-nuls tels que $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{OA} \times \overrightarrow{OH}$, où H est le projeté orthogonal de B sur (OA) .

Pour $-\frac{\pi}{2} < (\vec{u}, \vec{v}) < \frac{\pi}{2}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = OA \times OH$$

Pour $\frac{\pi}{2} < (\vec{u}, \vec{v}) < \frac{3\pi}{2}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -OA \times OH$$

Pour $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

2 Vecteurs orthogonaux

Définition:

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont dits orthogonaux si :

- soit $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$;
- soit $(OA) \perp (OB)$ si $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$ sont non-nuls.

Propriété:

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si et seulement si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Démonstration:

Montrons les deux implications :

$\boxed{\Rightarrow}$ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux alors soit : <ul style="list-style-type: none"> • $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$; • $(OA) \perp (OB)$ avec $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$. Dans les deux cas, on a bien $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.	$\boxed{\Leftarrow}$ Si $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ alors soit : <ul style="list-style-type: none"> • $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ et alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux. • $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$ avec $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$ alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{OA} \cdot \vec{OH}$ où H est le projeté orthogonal de B sur (OA). $\vec{OA}$ et $\vec{OH}$ sont colinéaires et $\vec{OA} \neq \vec{0}$ donc $\vec{OH} = \vec{0}$ c'est à dire $H = O$ ainsi $(OA) \perp (OB)$ et $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
---	---

3 Autres expressions du produit scalaire

3.1 En fonction des normes et de l'angle

Propriété:

Pour tous vecteurs non-nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$$

Démonstration:

- **Premier cas de figure** : $(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\pi}{2} \pmod{\pi}$, on a immédiatement $\cos(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

- **Second cas de figure** : $-\frac{\pi}{2} < (\vec{u}, \vec{v}) < \frac{\pi}{2}$

Posons $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$. Le projeté orthogonal de B sur (OA) est tel que $\frac{OH}{OB} = \cos \widehat{AOB}$ et :

- $OA = \|\vec{u}\|$ et $OB = \|\vec{v}\|$;
- $\cos \widehat{AOB} = \cos(\vec{OA}, \vec{OB})$ donc $OH = OB \times \cos(\vec{OA}, \vec{OB}) = \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$.

Conclusion : $\vec{u} \cdot \vec{v} = OA \times OH = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

- **troisième cas de figure** :

Posons $\vec{u} = \vec{OA}$ et $\vec{v} = \vec{OB}$. Le projeté orthogonal de B sur (OA) est tel que $\frac{OH}{OB} = \cos \widehat{BOH}$ et :

- $OA = \|\vec{u}\|$ et $OB = \|\vec{v}\|$;
 - $\cos \widehat{BOH} = \cos[\pi - (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})] = -\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})$ donc $OH = -OB \times \cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}) = -\|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$.
- Conclusion :** $\vec{u} \cdot \vec{v} = -OA \times OH = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v})$

3.2 En fonction des coordonnées (expression analytique)

Propriété:

Si deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ont pour coordonnées respectives $(x; y)$ et $(x'; y')$ dans un repère orthonormal, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Démonstration:

- Si $\vec{u} = \vec{0}$ (ou $\vec{v} = \vec{0}$) alors $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0x' + 0y' = 0$ donc la formule est vérifiée.
- Si $\vec{u} \neq \vec{0}$ et $\vec{v} \neq \vec{0}$, on note $\vec{u} = \overrightarrow{OA}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{OB}$.
On utilise le repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$ tel que $\vec{i}$ et $\overrightarrow{OA}$ sont colinéaires de même sens et $(\vec{i}, \vec{j}) = \frac{\pi}{2}$. Dans ce repère,

$$A(\|\vec{u}\|, 0) \text{ et } B(\|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}); \|\vec{v}\| \sin(\vec{u}, \vec{v}))$$

donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\vec{u}, \vec{v}) = xx' + 0y' = xx' + yy'$

Remarque:

Si $\vec{u}(x; y)$ alors $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = x^2 + y^2$ et comme $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$, on a :

$$\vec{u}^2 = \|\vec{u}\|^2$$

Propriété:

Pour tous vecteurs $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ et tout réel k :

- $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ On dit que le produit scalaire est symétrique.
- $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$ et $(k \vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ On dit que le produit scalaire est linéaire.

3.3 En fonction des normes

Propriété:

Pour tous vecteurs non-nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

Démonstration:

Pour tous vecteurs non-nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$,

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v}) \\ &= \vec{u} \cdot \vec{u} + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{v} \cdot \vec{v} \quad \text{On en déduit donc que :} \\ &= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

d'où :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

4 Produit scalaire et équation de droite

Définition:

Un vecteur $\vec{n}$ est **normal** à une droite (d) si $\vec{n} \neq \vec{0}$ et que la direction de $\vec{n}$ est orthogonale à celle de la droite (d) .

Remarque:

Un vecteur normal $\vec{n}$ d'une droite (d) est orthogonal à tout vecteur directeur de (d) . Si A est un point de la droite (d) , alors la droite (d) est l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$

Théorème:

Dans un repère orthonormal,

- Si (d) est une droite qui a une équation de la forme $ax + by + c = 0$, $(a; b) \neq (0; 0)$ alors le vecteur $\vec{n}(a; b)$ est un vecteur normal à (d)
- Si un vecteur non-nul $\vec{n}(a; b)$ est normal à (d) alors (d) a une équation de la forme $ax + by + c = 0$.

Démonstration:

$\Rightarrow$

D'après le théorème précédent, $\vec{u}(-b; a)$ est un vecteur directeur de (d) et $\vec{u} \cdot \vec{n} = -b \times a + a \times b = 0$ donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux.

$\Leftarrow$

D'après la remarque précédente, (d) est l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que $\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$. On pose $A(x_A; y_A)$, on obtient :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \Leftrightarrow (x - x_A)a + (y - y_A)b = 0 \Leftrightarrow ax + by + (-ax_A - by_A) = 0$$

Conclusion : (d) a une équation de la forme $ax + by + c = 0$ avec $c = -ax_A - by_A$.

Exemple:

On a tracé dans le repère ci-dessous la droite Δ d'équation $2x - 5y - 4 = 0$:

- $\vec{u}(5; 2)$ est un vecteur directeur de Δ .
- $\vec{n}(2; -5)$ est un vecteur normal à Δ .

Théorème:

Dans un repère orthonormal, les droites (d) et (d') ont pour équation respectives $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$.

- (d) et (d') sont perpendiculaires si et seulement si $aa' + bb' = 0$
- (d) et (d') sont parallèles si et seulement si $ab' - a'b = 0$