DEVOIR COMMUN - MATHEMATIQUES

Enseignants : BERNARD F., GREAU D., LEDAUPHIN S. LEPICIER J.M., SECHER P. Date : 11/12/2013	Nom : Prénom : Classe :	Note :
---	--	---------------

Exercice 1:

12 points

1. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $f(1) = 5$; $f(-2) = -3$ et $f(7) = 28$. f peut elle être affine?
2. Soit g une fonction affine telle que $g(-4) = 1$ et $g(3) = -3$. Déterminer l'expression de g .
3. Déterminer une expression des fonctions affines f_1 et f_2 représentées ci-dessous : (on justifiera ses résultats)

4. On considère les fonctions f_3 et f_4 définies sur $\mathbb{R}$ par : $f_3(x) = \frac{1}{7}x - 2$ et $f_4(x) = -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3}$.
 - a. Déterminer les variations de f_4 .
 - b. Déterminer les possibles antécédents de 6 par la fonction f_4 .
 - c. Tracer sur le graphique ci-dessus les courbes représentatives des fonctions f_3 et f_4 .
 - d. Résoudre algébriquement l'inéquation $\frac{1}{7}x - 2 \geq 0$.
 - e. Déterminer suivant les valeurs de x le signe de $f_3(x)$.
5. Déterminer, suivant les valeurs de x , le signe des expressions suivantes :
 - a. $3x - 1$
 - b. $5 - 2x$

Exercice 2:

12 points

Le dessin ci-dessous est une courbe C représentative d'une fonction f .

En regardant le dessin ci-dessus répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le domaine de définition de f ?
2. Quelle est l'image de 2 par f ?
3. Quels sont les antécédents de 1 par f ?
4. A combien est égal $f(5)$?
5. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.
6. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 3$.
7. Dresser le tableau de variation de f sur son domaine de définition.
8. Dresser le tableau de signe de f sur son domaine de définition.
9. Quel est le maximum de f sur $[-5; 3]$?
10. Quel est le minimum de f sur $[-5; 3]$?
11. Si x appartient à l'intervalle $[0; 8]$ à quel intervalle appartient $f(x)$?
12. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$g(x) = -\frac{5}{16}x^2 + \frac{5}{4}x + \frac{15}{4}$$

a. A l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
$g(x)$											

- b. Faire la représentation graphique de g sur le repère ci-dessus.
- c. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) > f(x)$ sur $[-7; 9]$.

Exercice 3:

6 points

On considère le dessin ci-dessous.

- Placer le point C tel que $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.
 - En déduire la nature du quadrilatère $ABCD$.
- Placer les points E et F tels que $\overrightarrow{DE} = 2\overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{CF} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$.
- Démontrer que $\overrightarrow{EC} = -2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}$.
- Les points E , C et F sont-ils alignés ?

Exercice 4:

10 points

1. Soient les points suivants définis dans un repère orthonormé d'origine O :

$$A(2; 4); B(-1; -2); C(3; 0); D(-2; -4); E(4; 5)$$

Placer les points sur la figure ci dessous.

2. Calculer les coordonnées des vecteurs suivants :

$$\vec{AB}, \vec{BC}, \vec{OA}, \vec{AE} \text{ et } \vec{DO}$$

3. Indiquer deux vecteurs égaux. Que peut-on en déduire?

4. Calculer $2\vec{OB}$, en déduire $\vec{OB}$ en fonction de $\vec{OD}$. Que peut-on en déduire?

5. Les vecteurs $\vec{AE}$ et $\vec{BC}$ sont-ils colinéaires? Que peut-on en conclure?

6. Les vecteurs $\vec{OD}$ et $\vec{OA}$ sont-ils colinéaires? Que peut-on en conclure?

7. Déterminer par le calcul les coordonnées du point F tel que $\vec{AF} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{CD}$.

CORRIGE DU DEVOIR COMMUN - MATHEMATIQUES

Exercice 1:

12 points

1. 1,5 $\frac{f(-2) - f(1)}{-2 - 1} = \frac{8}{3}$ et $\frac{f(7) - f(1)}{7 - 1} = \frac{23}{6}$ donc f ne peut pas être affine.

2. 1,5 g est une fonction affine donc $g(x) = ax + b$. De plus $g(-4) = 1$ et $g(3) = -3$ donc on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} -4a + b = 1 & L_1 \\ 3a + b = -3 & L_2 \end{cases} \iff \begin{cases} -4a + b = 1 & L_1 \\ 7a = -4 & L_2 - L_1 \end{cases} \iff \begin{cases} -4 \times \left(-\frac{4}{7}\right) + b = 1 \\ a = -\frac{4}{7} \end{cases} \iff \begin{cases} b = -\frac{9}{7} \\ a = -\frac{4}{7} \end{cases}$$

On en déduit que $g(x) = -\frac{4}{7}x - \frac{9}{7}$.

3. 2 $\times$ (0,5 + 1) Par lecture graphique, on obtient que $f_1(x) = 2x - 1$ et $f_2(x) = -\frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$

4. a. 2 $\times$ 0,25 f_4 est une fonction affine avec $a = -\frac{1}{3} < 0$ donc f_4 est décroissante sur $\mathbb{R}$.

b. 1 $f_4(x) = 6 \iff -\frac{1}{3}x + \frac{5}{3} = 6 \iff x = 13$

c. 2 $\times$ 1 Voir ci-dessus.

d. 0,5 $\frac{1}{7}x - 2 \geq 0 \iff \frac{1}{7}x \geq 2 \iff x \geq 14$ donc $\frac{1}{7}x - 2 \geq 0$ sur $[14; +\infty[$

e. 0,5 On en déduit que $f_3(x) \leq 0$ sur $] -\infty; 14]$ et $f_3(x) \geq 0$ sur $[14; +\infty[$. On peut résumer cela dans le tableau de signe ci-dessous :

x	$-\infty$	14	$+\infty$
$f_3(x)$	-	0	+

5. a. 0,75 $3x - 1$ est une fonction affine avec $a = 3$ et $b = -1$ donc $-\frac{b}{a} = \frac{1}{3}$ d'où :

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$3x - 1$	-	0	+

b. 0,75 $5 - 2x$ est une fonction affine avec $a = -2$ et $b = 5$ donc $-\frac{b}{a} = \frac{5}{2}$ d'où :

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
$5 - 2x$	+	0	-

1. 0,5 f est définie sur $[-7; 9]$.
2. 0,25 $f(2) = 3$
3. 4 $\times$ 0,25 f admet $-5, -1, 3$ et 7 pour antécédents par la fonction f .
4. 0,25 $f(5) = -1$
5. 3 $\times$ 0,25 $f(x) = 3$ pour $x \in \{-6; 2; 9\}$.
6. 1 $f(x) \leq 3$ pour $x \in [-6; 9]$.
7. 1,5 Tableau de variation de f :

x	-7	-3	2	5	9
$f(x)$	5	-2	3	-1	3

8. 1,5 Tableau de signe de f :

x	-7	-4	-2	4	6	9
$f(x)$	+	0	-	0	+	0

9. 2 $\times$ 0,25 Le maximum de f sur $[-5; 3]$ est 3 et il est atteint en $x = 2$.
10. 2 $\times$ 0,25 Le minimum de f sur $[-5; 3]$ est -2 et il est atteint en $x = -3$.
11. 0,75 Pour $x \in [0; 8]$, $f(x) \in [-1; 3]$.
12. a. 1,5 Tableau :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7
$g(x)$	-2,8125	0	2,1875	3,75	4,6875	5	4,6785	3,75	2,1875	0	-2,8125

- b. 1 Voir ci-dessus.
- c. 1 $g(x) > f(x)$ pour $x \in]-2; 6[$.

1. a. 0,5 Voir ci-dessus.

b. 1,5 D'après la règle du parallélogramme, $ABCD$ est un parallélogramme.

2. 1 + 1 Voir ci-dessus.

3. 2 D'après la relation de Chasles,

$$\begin{aligned}
 \overrightarrow{EC} &= \overrightarrow{ED} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AC} \\
 &= 2\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} \\
 &= 2\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} \\
 &= -2\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AB}
 \end{aligned}$$

4. 1 $\overrightarrow{EC} = 2\overrightarrow{CF}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{EC}$ et $\overrightarrow{CF}$ sont colinéaires d'où les points E , C et F sont alignés.

Exercice 4:

10 points

1. $5 \times 0,25$ Placer les cinq points.

2. $5 \times 0,5$ $\vec{AB}(-3; -6)$; $\vec{BC}(4; 2)$; $\vec{OA}(2; 4)$; $\vec{AE}(2; 1)$; $\vec{DO}(2; 4)$

3. $0,5 + 0,5$ $\vec{DO} = \vec{OA}$ (mais aussi et si les coordonnées ont été calculées : $\vec{BD} = \vec{OB}$) donc O milieu de $[AD]$

4. $3 \times 0,5$ $2\vec{OB} = \vec{OD}$, donc B milieu de $[OD]$

5. $0,5 + 0,5$ Les vecteurs $\vec{AE}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires donc les droites (BC) et (AE) sont parallèles.

6. $0,5 + 0,5$ Les vecteurs $\vec{OD}$ et $\vec{OA}$ sont colinéaires donc les points O , D et A sont alignés.

7. $1,75$ Soit $F(x; y)$ tel que $\vec{AF} = \frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{CD}$. Comme $\frac{1}{3}\vec{AB} + \vec{CD}(-6; -6)$, on a :

$$\begin{cases} x - x_A = -6 \\ y - y_A = -6 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -4 \\ y = -2 \end{cases}$$

donc $F(-4; -2)$