Intervalle de fluctuation

1 Loi binomiale

Au sein d'une population, on suppose que la proportion d'un certain caractère est p . On souhaite juger cette hypothèse. Pour cela on prélève dans la population au hasard et avec remise, un échantillon de taille n sur lequel on observe une fréquence f de ce caractère.

Définition:

L'intervalle de fluctuation au seuil de $1 - \alpha$ d'une fréquence, sur un échantillon aléatoire de taille n , selon la loi binomiale de paramètres n et p est :

$$\left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$$

avec a le plus petit entier tel que $P(X \leq a) > \frac{\alpha}{2}$ et b le plus petit entier tel que $P(X \leq b) \geq 1 - \frac{\alpha}{2}$.

Règle:

- Si $f \in \left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$, l'hypothèse est acceptée au seuil de $1 - \alpha$;
- Si $f \notin \left[\frac{a}{n}; \frac{b}{n} \right]$, l'hypothèse est rejetée au seuil de $1 - \alpha$.

Exercice 1:

Voici les résultats du premier tour de l'élection présidentielle de 2002, où un total de 28.498.471 bulletins de votes furent comptabilisés :

Nom	CHIRAC	LE PEN	JOSPIN
Prénom	Jacques	Jean-Marie	Lionel
Partie	RPR	FN	PS
% des voix exprimés	19,88%	16,86%	16,18%

1. Déterminer le nombre de voix obtenues par chacun de ces cinq candidats.

Voici les résultats de sondages effectués avant ce premier tour sur un panel représentatif de 1.000 électeurs. Chaque sondage correspond ainsi à un échantillon de 1.000 personnes.

Nom	CHIRAC	LE PEN	JOSPIN
Prénom	Jacques	Jean-Marie	Lionel
10-11 avril - CSA	21%	12%	19%
13-15 avril - Sofres	20%	13%	18%
17-18 avril - CSA	19,5%	14%	18%

2. Déterminer, en utilisant la loi binomiale, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% pour chaque candidat.
3. Déterminer les échantillons que l'on peut valider au seuil de 95%.
4. Conclure.

2 Théorème de Moivre-Laplace

On rappelle ci-dessous l'énoncé du théorème de Moivre-Laplace :

Théorème:

Soit, pour tout entier n , une variable aléatoire X_n qui suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ et $Z_n = \frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$, la variable centrée réduite associée à X_n . Alors pour tous nombres a et b tels que $a \leq b$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(a \leq Z_n \leq b) = P(a \leq Z \leq b)$$

où Z suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

On considère à présent la variable aléatoire Z qui suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$ et $\alpha \in]0; 1[$. On a démontré précédemment qu'il existe un unique réel u_α tel que $P(-u_\alpha \leq Z \leq u_\alpha) = 1 - \alpha$.

Exercice 2:

Démontrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{X_n}{n} \in I_n\right) = 1 - \alpha$ où $I_n = \left[p - u_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}; p + u_\alpha \frac{\sqrt{p(1-p)}}{\sqrt{n}}\right]$

Définition:

Sous les conditions énoncées dans le théorème ci-dessus, on dit que l'intervalle I_n est un intervalle de fluctuation asymptotique de la variable aléatoire fréquence $F_n = \frac{X_n}{n}$ au seuil de $1 - \alpha$. Ainsi, pour n grand, la variable aléatoire F_n prend ses valeurs dans l'intervalle I_n avec une probabilité proche de $1 - \alpha$. En pratique, on utilise cet intervalle de fluctuation de F_n dès que $n \geq 30$; $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$.

Exercice 3:

Dans l'exercice 1, déterminer les intervalles de fluctuation asymptotique au seuil de 0,95 et au seuil de 0,99 pour chaque candidat. Conclure.

Exercice 4:

Une compagnie aérienne possède des avions d'une capacité de 300 places. Cette compagnie a vendu n billets pour le vol 2013. La probabilité pour qu'un acheteur se présente à l'embarquement est p et les comportements des acheteurs sont indépendants les uns des autres. On note X_n la variable aléatoire désignant le nombre d'acheteurs d'un billet se présentant à l'embarquement. La compagnie cherche à optimiser le remplissage de l'avion en vendant éventuellement plus de places que la capacité totale de l'avion (surréservation ou surbooking) soit ici $n > 300$. Comme il y a évidemment un risque que le nombre de passagers munis d'un billet se présentant à l'embarquement excède 300, la compagnie veut maîtriser ce risque.

1. Déterminer la loi de X_n .
2. On suppose $p \in [0, 5; 0, 95]$. Écrire l'intervalle de fluctuation asymptotique I_n de $\frac{X_n}{n}$ au seuil de 0,95.
3. Montrer que si $I_n \subset \left[0; \frac{300}{n}\right]$ alors la probabilité que le nombre de passagers se présentant à l'embarquement excède 300 est proche de 0,05.
4. On cherche à déterminer la valeur de n maximale permettant de satisfaire la condition de l'inclusion $I_n \subset \left[0; \frac{300}{n}\right]$.
 - a. Montrer que $I_n \subset \left[0; \frac{300}{n}\right] \implies pn + 1,96\sqrt{n}\sqrt{p(1-p)} - 300 \leq 0$.
 - b. On pose $f(x) = px + 1,96\sqrt{x}\sqrt{p(1-p)} - 300$. Montrer qu'il existe un entier n_0 tel que si $n \leq n_0$ alors $f(n) \leq 0$ et si $n > n_0$ alors $f(n) > 0$.
 - c. Tracer la courbe représentative de f pour les valeurs $p = 0,85$; $p = 0,9$; $p = 0,95$.
 - d. Déterminer à la calculatrice les valeurs de n_0 pour $p = 0,85$; $p = 0,9$; $p = 0,95$.